

Clindacin® Clindamicina 1%

Gel

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

Fórmula:

Cada 100 g de gel contiene:

Clindamicina base (como fosfato de Clindamicina)	1,00 g
Carbopol 940	1,20 g
Metilparabeno	0,10 g
Hidróxido de Sodio	c.s.p. pH 6,00
Alcohol Isopropílico	20,00 g
Propilenglicol	5,00 g
Agua Destilada c.s.p.	100,00 g

Acción terapéutica:

Agente antiinfeccioso para el tratamiento del acné.

Acción farmacológica:

Probablemente debido a su actividad antibacterial, se cree que el uso tópico de Clindamicina reduce las concentraciones de los ácidos grasos sobre la piel e inhibe el desarrollo de *Propionibacterium acnes*, un anaerobio encontrado en glándulas sebáceas y folículos. Este microorganismo produce proteasas, lipasas y factores quimiotácticos causantes de la inflamación.

Farmacocinética:

La Clindamicina presenta una absorción por piel de aproximadamente 1.7% luego de su aplicación tópica cada 12 horas, durante 4 días, sobre una superficie de 300 cm². (USP DI 18^ª ED.)

Indicaciones:

CLINDACIN® está indicado para el tratamiento del acné vulgaris de grados II y III, caracterizados por lesiones inflamatorias tales como pápulas y pústulas.

Posología:

Adultos y adolescentes: CLINDACIN® se aplica en forma tópica sobre el área afectada dos veces al día.

Niños menores de 12 años: No se han demostrado la eficacia y seguridad del uso de Clindamicina en niños.

Contraindicaciones:

CLINDACIN® está contraindicado en individuos con antecedentes de hipersensibilidad a Clindamicina u otras Lincomicinas, antecedentes de enteritis regional o colitis ulcerosa, o de colitis asociada a antibióticos.

Advertencias:

No se ha establecido la seguridad de CLINDACIN® en el embarazo, ni se conoce si se excreta en la leche materna. Como medida general, no se aconseja el uso del producto durante el embarazo ni la lactancia.

Precauciones:

CLINDACIN® debe aplicarse sobre la piel limpia, evitando el contacto con los ojos, nariz, boca y mucosas.

Interacciones con otras drogas / problemas relacionados:

Las siguientes interacciones medicamentosas y/o problemas relacionados han sido seleccionados en la base de su potencial significado clínico (los posibles mecanismos aparecen entre paréntesis cuando es apropiado).

Nota: Combinaciones conteniendo alguno de los siguientes principios activos, dependiendo de la cantidad presente, pueden interactuar con la medicación.

- Jabones o limpiadores medicinales o abrasivos.
- Preparaciones para el acné conteniendo agentes removedores de piel, tales como:
 - Resorcinol
 - Ácido Salicílico
 - Sulfuros
- Preparaciones tópicas conteniendo alcohol, tales como:
 - Lociones para después de afeitarse
 - Astringentes
 - Perfumes
 - Cremas de afeitarse
- Cosméticos o jabones con fuerte efecto secante
- Isotretinoína
- Cosméticos

(El uso concurrente con Clindamicina fosfato tópica puede causar efectos irritantes y/o secantes acumulativos, especialmente con la aplicación de agentes removedores, descamadores, o abrasivos, que darían como resultado una excesiva irritación de la piel).

Reacciones adversas:

Los siguientes efectos adversos incluidos han sido seleccionados en base a su potencial significado clínico (los posibles signos y síntomas aparecen entre paréntesis cuando es apropiado).

Requieren atención médica:**Incidencia menos frecuente:**

Dermatitis por contacto o hipersensibilidad (rash cutáneo, prurito, enrojecimiento, hinchazón, u otro síntoma de irritación que no estuviera presente antes de la terapia).

Incidencia rara:

Colitis pseudomembranosa (calambres estomacales o abdominales, dolor, hinchazón severa, diarrea severa que puede llegar a ser sanguinolenta, fiebre, sed excesiva, náuseas, vómitos; raramente cansancio o debilidad, pérdida de peso inusual).

Requieren atención médica sólo si persisten o son molestos:**Incidencia más frecuente:**

Resecamiento, descamación o remoción de la piel.

Incidencia menos frecuente:

Desordenes gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea moderada).

Irritación, sensibilización o engrasamiento de la piel.

Picazón o ardor en la piel.

Indican colitis pseudomembranosa y requieren atención médica si ocurren después de discontinuar la medicación:

Calambres estomacales o abdominales, dolor e hinchazón severa, diarrea severa que puede llegar a ser sanguinolenta, fiebre, sed excesiva, náuseas, vómitos; raramente cansancio o debilidad, pérdida de peso inusual.

Uso apropiado de la medicación:

Antes de la aplicación se debe lavar bien la zona a tratar con agua tibia y jabón, enjuagar con abundante agua y secar bien.

Es importante que la medicación se aplique sobre la totalidad del área afectada.

Evitar los lavados frecuentes en el área afectada.

Llevar a cabo la terapia completa, que puede llevar meses o más.

Dosificar de manera adecuada.

Esperar 30 minutos para la aplicación luego de afeitarse o lavarse.

No debe aplicarse mientras se está fumando, cerca de una llama o alguna otra fuente de calor.

Evitar el contacto del producto con los ojos, nariz, boca, u otras membranas mucosas.

No usar mas cantidad de la prescrita.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación y/o intoxicación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 - 4658-7777/4658/3002, int. 1101, 1102 y 1103.

Presentación:

Envases conteniendo 1 pomo por 50 g.

Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30°C.

Preservar de la luz.

Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 51075

Directora Técnica: M. Gabriela Palma, Farmacéutica.