

# Paracne<sup>®</sup>

## Peróxido de Benzoilo

### 5% - 10%

#### Gel

Industria Argentina

Venta Bajo Receta

#### Fórmula:

Peróxido de Benzoilo 5%

Cada 100 g de Gel contiene:

Peróxido de Benzoilo .....	5,00 g
(Como Peróxido de Benzoilo Hidratado)	
Carbopol 940 .....	1,00 g
Edetato Disódico .....	0,05 g
Glicerina .....	3,00 g
Propilenglicol .....	5,00 g
Trietanolamina .....	c.s.p. pH: 5,5
Agua Destilada .....	c.s.p. 100 g

Peróxido de Benzoilo 10 %

Cada 100 g de Gel contiene:

Peróxido de Benzoilo .....	10,00 g
(Como Peróxido de Benzoilo Hidratado)	
Carbopol 940 .....	1,00 g
Edetato Disódico .....	0,05 g
Glicerina .....	3,00 g
Propilenglicol .....	5,00 g
Trietanolamina .....	c.s.p. pH: 5,5
Agua Destilada .....	c.s.p. 100 g

#### Acción Terapéutica:

Queratolítico - Antibacteriano.

#### Acción Farmacológica:

El mecanismo de acción del Peróxido de Benzoilo no se conoce por completo. El Peróxido de Benzoilo es un agente antibacteriano con una actividad demostrada frente al *Propionibacterium acnes*, que además presenta un efecto levemente queratolítico. El Peróxido de Benzoilo se absorbe por la piel donde es metabolizado a Acido Benzoico y se elimina posteriormente por orina.

#### Indicaciones:

Está indicado el tratamiento tópico del Acné vulgaris leve a moderado.

#### Posología y Forma de Administración:

Aplíquese PARACNE Gel de una a dos veces diarias sobre las áreas afectadas después de lavarlas con un jabón suave no irritante.

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a cualquier componente de este producto.

**Precauciones:**

Uso externo exclusivo.

Si se produce irritación severa será necesario discontinuar su uso y consultar al médico. Este producto no debe aplicarse en zonas cercanas a los ojos ni a las membranas mucosas. Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto accidental con los ojos, párpados, labios o mucosas, enjuagar con abundante agua.

**Embarazo:** Categoría C. Se desconoce si el Peróxido de Benzoilo puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas, por lo cual no deberá ser usado por mujeres embarazadas salvo que el médico lo considere indispensable.

**Lactancia:** Se desconoce si el Peróxido de Benzoilo se excreta en la leche materna. Dado que muchas drogas se excretan en la leche materna deberá tenerse precaución en la administración de este producto a mujeres durante la lactancia.

**Pediatría:** No se ha establecido la eficacia y seguridad de este producto en niños menores de 12 años de edad.

**Reacciones Adversas:**

Las reacciones adversas más frecuentes asociadas a uso tópico de Peróxido de Benzoilo son: Eritema excesivo y exfoliación que se espera que ocurran en un 5 % de los pacientes. Suele aparecer en la fase inicial del tratamiento, y se controla mediante la reducción de la frecuencia de aplicación.

**Sobredosificación:**

Si se llegara a presentar escamosidad, eritema o edema excesivos, debe discontinuarse el uso del producto, pudiendo aplicarse compresas frías. Si la reacción fuese de origen alérgico el producto no deberá ser usado nuevamente. Si en cambio el origen de la reacción fuera una sobredosificación podrá usarse nuevamente a menores dosis y menos frecuencia.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777 / 4658-3002, int. 1101, 1102 y 1103.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

**Presentación:**

PARACNE Gel 5%: Pomos conteniendo 60 g de Gel.

PARACNE Gel 10%: Pomos conteniendo 60 g de Gel.

**Conservar a temperatura no mayor de 25°C.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción Médica y no puede repetirse sin una nueva receta Médica.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 47106.

Directora Técnica: M. Gabriela Palma, Farmacéutica.



Laboratorios **PANALAB S.A. ARGENTINA**  
Famatina 3415 (C14371OK) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires 0800-222-2666